



ASSESSORATO DEL TURISMO, SPORT, COMMERCIO, AGRICOLTURA E BENI CULTURALI

UFFICIO SERVIZI FITOSANITARI




In collaborazione con:





ISTITUT AGRICOLE REGIONAL

TRATTAMENTI DI DIFESA INTEGRATA SU CILIEGIO 2019

(In base all'art. 19 - D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150)

PRESCRIZIONI PER I TRATTAMENTI

<ul style="list-style-type: none"> • <u>DURANTE IL PERIODO DELLA FIORITURA</u> È VIETATO L' UTILIZZO DI INSETTICIDI, ACARICIDI, DISECCANTI E DISERBANTI • IN FIORITURA È CONSENTITO L'UTILIZZO DI FUNGICIDI SOLO IN CASO DI CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI MALATTIE CRITTOGAMICHE DIRAMATO CON COMUNICATO FITOSANITARIO E DI FITOREGOLATORI SOLO SE IL LORO IMPIEGO SUL FIORE È AUTORIZZATO IN ETICHETTA • È OBBLIGATORIO SFALCIARE LE ERBE SPONTANEE FIORITE PRESENTI SOTTOCHIOMA SU TUTTA LA SUPERFICIE COLTIVATA ANCHE FUORI DAL PERIODO DELLA FIORITURA DELLA COLTURA IN CASO DI UTILIZZO DI INSETTICIDI, ACARICIDI, DISECCANTI E DISERBANTI. <p>SI RICORDA CHE NEL PERIODO DELLA FIORITURA QUESTA PRATICA FAVORISCE ANCHE L'IMPOLLINAZIONE IN QUANTO ELIMINA LA CONCORRENZA DELLE FIORITURE NATURALI - ES. TARASSACO, TRIFOGLIO ECC. - STIMOLANDO LE API A BOTTINARE SULLA COLTURA IN FIORE.</p>	 
<ul style="list-style-type: none"> • EVITARE LE MISCELE DI INSETTICIDI E FUNGICIDI E LE MISCELE DI PIÙ PRODOTTI FITOSANITARI IN GENERE, OVE POSSIBILE, IN QUANTO L'EFFETTO TOSSICO NEI CONFRONTI DEI PRONUBI AUMENTA • TRATTARE AL MATTINO PRESTO O ALLA SERA TARDI, FUORI DALLE ORE DI MASSIMO VOLO DELLE API. • IN CASO SI EFFETTUINO TRATTAMENTI AUTORIZZATI IN FIORITURA, TRATTARE SEMPRE VERSO SERA PER EVITARE CHE LE API E ALTRI IMPOLLINATORI SIANO ESPOSTI AD UN CONTATTO DIRETTO CON IL PRODOTTO UTILIZZATO. • TRATTARE I FILARI A CONFINE SOLO DALL'ESTERNO VERSO L'INTERNO • PRIMA DI OGNI TRATTAMENTO, CONTROLLARE CHE I PRODOTTI COMMERCIALI CHE SI INTENDONO UTILIZZARE NON SIANO STATI REVOCATI, CHE SIANO REGISTRATI SULLA COLTURA DA TRATTARE E CHE L'UTILIZZO SIA CONSENTITO CONTRO L'ORGANISMO NOCIVO CHE SI VUOLE COMBATTERE 	

<p>RISPETTARE RIGOROSAMENTE LE INDICAZIONI CONTENUTE IN ETICHETTA E IN PARTICOLARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LE DOSI E ALLE MODALITA' DI PREPARAZIONE DELLA MISCELA E DI IMPIEGO • I TEMPI DI CARENZA (*) E DI RIENTRO(**) • IL RISPETTO DELLE FASCE (DISTANZE) DAI CORSI D'ACQUA. 	 
<p>ADOTTARE TUTTE LE MISURE NECESSARIE PER RIDURRE I FENOMENI DI DERIVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOTTOPORRE AL CONTROLLO FUNZIONALE PREVISTO DAL PAN LE MACCHINE IRRORATRICI E ED EFFETTUARE UNA MANUTENZIONE COSTANTE DELLE STESSE • NON TRATTARE IN PRESENZA DI VENTO • TRATTARE I FILARI A CONFINE SOLO DALL'ESTERNO VERSO L'INTERNO • UTILIZZARE, OVE POSSIBILE, UGELLI ANTIDERIVA 	
<p>DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI CON PARTICOLARI FRASI DI RISCHIO COME PREVISTO DAL PIANO DI AZIONE NAZIONALE SULL'USO SOSTENIBILE DEI FITOFARMACI A 30 METRI DALLE ZONE FREQUENTATE DA POPOLAZIONE E GRUPPI VULNERABILI</p> <p>APPLICARE I CARTELLI DI PERICOLO NELLE ZONE TRATTATE SECONDO QUANDO INDICATO DALLA DGR 342/2017</p>	
<p>I contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall' art. 27 della lr 56/82 modificata dalla lr 78/92 e alle sanzioni previste dal Dlgs 150/2012</p> <p>(*) tempo di carenza: il numero minimo di giorni che deve intercorrere tra la data del trattamento e la data di raccolta dei prodotti agricoli.</p> <p>(**) tempo di rientro: numero di giorni che deve intercorrere tra la data del trattamento e la data in cui l'operatore può rientrare nel campo trattato</p>	

Epoca o stadio fenologico	Parassita o patogeno	Principio attivo (P.A.)	NOTE
Gemme gonfie	Malattie fungine	<ul style="list-style-type: none"> - Rame (Bio) - POLISOLFURO di Ca (Bio) - Captano 	<p>con i rameici si possono eseguire solo interventi invernali e autunnali 10-20 g/hl di rame metallo. Sono autorizzati al max 4 kg di rame/ha/anno o 28 kg/Cu/ha in 7 anni.</p> <p>I polisolfuro non è miscibile e va usato a distanza di 15 gg da altri prodotti.</p>
	Cocciniglie	<ul style="list-style-type: none"> - Olio Minerale (Bio) - Pyriproxifen 	<p>Il polithiol è efficace anche contro l'oidio e eriofidi. Non va usato dopo la rottura delle gemme.</p> <p>Da utilizzare solo prima della fioritura</p>
Fioritura	<p>E' vietato qualsiasi trattamento antiparassitario salvo autorizzazione e comunque non è mai consentito l'uso di insetticidi, aficidi e acaricidi per salvaguardare le api, indispensabili per la loro azione impollinatrice</p>		

Epoca o stadio fenologico	Parassita o patogeno	Principio attivo (P.A.)	NOTE
Caduta petali	Monilia	- Bacillus subtilis (Bio) - Fenhexamid - Tebuconazolo - Fenbuconazolo - Cyprodinil + fludioxonil - Boscalid + Pyraclostrobin	
	Corineo	- Ziram - Captano	
Allegagione	Monilia e Corineo	Intervenire con i prodotti indicati a caduta petali	
	Cilindrosporiosi	- Dodina	
	Cocciniglia	- Spirotetramat	Autorizzato solo dopo la fioritura. Registrato anche su afide nero
	Afidi	- Acetamiprid - Pirimicarb - Piretro naturale (Bio)	
Pre raccolta (invaiaura)	Mosca del ciliegio	- Spinosad (Bio) - Etofenprox - Fosmet - Acetamiprid	Spinosad in formulazione Fly da utilizzare come esca insetticida. Si consiglia l'utilizzo di trappole con esca proteica attivate con insetticida per la cattura massale.
	Drosophila suzuki	- Acetamiprid - Deltametrina - Spinetoram	Si consiglia di eseguire il monitoraggio con trappole innescate con aceto di mele e di eliminare tempestivamente i frutti colpiti.
	Monilia	Vedi caduta petali	Attenzione al tempo di carenza dei prodotti
Caduta foglie	Malattie fungine	- Rame (Bio)	con i rameici si possono eseguire solo interventi invernali e autunnali

ATTENZIONE

Questo documento non deve in alcun caso essere considerato come un calendario dei trattamenti. Ad ogni stadio fenologico, sono necessarie osservazioni per giudicare l'opportunità a eseguire l'intervento suggerito.

LIMITAZIONI PER GLI ADERENTI ALLA MISURA AGROAMBIENTALE 10.1.3

Consultare il Disciplinare di Produzione Integrata alla seguente pagina WEB:

http://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/disciplinare_produzione_integrata_i.aspx

Per informazioni, rivolgersi ad uno degli uffici seguenti:

- Châtillon	Tel: 0166/62889	- Ufficio Servizi Fitosanitari	Tel: 0165/275420
- Morgex	Tel: 0165/800430	- Arnad	Tel: 0125/966438
- Aymavilles	Tel: 0165/902820	- Pont-St-Martin	Tel: 0125/807757
		- Pont-St-Martin uff. viticolo	Tel: 0125/806843

Siti WEB: www.regione.vda.it/agricoltura/imprese_e_agricoltori/fitosanitario/schedetrattamenti_i.asp oppure www.iaraosta.it