

PRODOTTI AUTORIZZATI SU MELO NELLE MISURE AGROAMBIENTALI

INSETTICIDI		
PRINCIPIO ATTIVO	Restrizioni nell'impiego	Note
ACETAMIPRID	Max 1 intervento a scelta tra Acetamiprid, Clotianidin, Imidacloprid e Thiametoxam. E' vietato l'uso di Imidacloprid e Thiametoxam prima della fioritura. Con i Neonicotinoidi sono autorizzati al max 2 interventi all'anno Clotianidin, per chi aderisce alle misure, non è autorizzato su pero.	
CLOTIANIDIN*		
IMIDACLOPRID		
THIAMETOXAM		
THIACLOPRID*	Max 1 intervento all'anno. Con i Neonicotinoidi sono autorizzati al max 2 interventi all'anno.	
AZADIRACTINA		
BACILLUS THURING.		
BUPROFEZIN		
CLORANTRANILIPROLO (Rynaxypyr)	Max 2 volte all'anno	
CLORPIRIFOS-ETHYL(1)	Max 3 volte all'anno in alternativa con il Fosmet.	
CLORPIRIFOS-METHYL(1)	Max 2 volte all'anno	
CIFLUTRIN	Max 1 volta all'anno con piretroidi	
DELTAMETRINA	Max 1 volta all'anno con piretroidi	
ETOFENPROX	Max 1 volta x anno o in pre-fior. o da 10 a 15 gg prima della raccolta.	
EMAMECTINA	Max 2 volte all'anno	
FLONICAMID	Max 1 volta all'anno	
FLUVALINATE	Max 1 volta all'anno in prefioritura. Per chi aderisce alle misure, non è autorizzato su pero.	
FOSMET (1)	Max 3 volte all'anno, in alternativa al Chlorpirifos-Ethyl	
OLIO MINERALE	Con Polithiol non trattare oltre gemma gonfia	
INDOXACARB*	Max 4 interventi all'anno	
PYRIPROXYFEN*	Max 1 volta all'anno e prima della fioritura.	
PIRIMICARB*		
PROTEINATO DI ZOLFO		
SALI POTASSICI		
SPINOSAD	Max 3 volte per anno	
SPIROTETRAMAT	Max 1 volta all'anno	
DIFLUBENZURON	Con il gruppo dei Chitino-inibitori (Diflubenzuron, Metossifenozone, Tebufenozone), sono autorizzati complessivamente 3 interventi all'anno	
METOSSIFENOZIDE		
TEBUFENOZIDE		
VIRUS GRANULOSI		
(1) Tra clorpirifos etile, clorpirifos metile e fosmet sono ammessi al massimo 4 trattamenti all'anno		
ACARICIDI (Al max 1 intervento all'anno e su autorizzazione del Servizio Fitosanitario Reg.)		
CLOFENTEZINE°	°E' possibile miscelare questi p.a. con un adulticida o trovare miscele già pronte.	
EXITIAZOX°		
ETOXAZOLE°		
ABAMECTINA*		
ACECHINOCIL		
MILBEMECTINA	Non ammesso su pero	
PYRIDABEN*		
TEBUFENPIRAD*		

* Per l'acquisto e l'impiego di questi p.a. è necessario avere il patentino.

FUNGICIDI			
	PRINCIPIO ATTIVO	Restrizioni nell'impiego	Note
P R E V E N T I V I	CIFLUFENAMID	Max 2 volte x anno, indipendentemente dall'avversità	
	DITIANON	(Dithianon +Pyraclostrobin non autorizzato causa R40)	
	DODINA	Non miscelare con oli e esterifosforici	
	FOSETIL ALLUMINIUM	Max 2 interventi contro il marciume del colletto	
	FLUAZINAM	Attenzione! 60 gg di carenza.	
	FLUDIOXONIL	Max 2 volte x anno, indipendentemente dall'avversità	
	METALAXIL M*	Max 2 interventi contro il marciume del colletto. No pero	
	QUINOXIFEN	Al massimo 3 volte all'anno. Fitotossico su cultivar imperatore Non autorizzato su pero.	
	RAME E DERIVATI	Ammesse anche le formulazioni Xn di idrossido di rame	
	ZOLFO		
	CAPTANO*	Max 2 volte x anno, indipendentemente dall'avversità	
	PYRACLOSTROBIN+ BOSCALID*	Strobilurine al max 3 volte all'anno. Boscalid, da solo o in miscela al max 3 volte all'anno.	
	TRIFLOXYSTROBIN	Strobilurine al max 3 volte all'anno.	
	METIRAM	I Ditiocarbammati sono autorizzati fino al 15 di giugno.	
	PROPINEB*	I Ditiocarbammati sono autorizzati fino al 15 di giugno.	
	POLISOLFURO di Ca		
	C U R A T I V I	BUPIRIMATE	
CYPRODINIL		Anilinopirimidine al max 4 volte all'anno.	
PYRIMETHANIL		Anilinopirimidine al max 4 volte all'anno.	
CIPROCONAZOLO		I.B.E. max 4 volte all'anno. Evitare le formulazioni Xn.	
DIFENOCONAZOLE		I.B.E. max 4 volte all'anno. Evitare le formulazioni Xn.	
FENBUCONAZOLO		I.B.E. max 4 volte all'anno. Evitare le formulazioni Xn.	
MICLOBUTANIL		I.B.E. max 4 volte all'anno. Evitare le formulazioni Xn.	
PENCONAZOLE		I.B.E. max 4 volte all'anno. Evitare le formulazioni Xn.	
TEBUCONAZOLO	I.B.E. max 4 volte all'anno. Evitare le formulazioni Xn.		
TETRACONAZOLE	I.B.E. max 4 volte all'anno. Evitare le formulazioni Xn.		

* Per l'acquisto e l'impiego di questi preparati è necessario avere il patentino.

Al momento dell'acquisto e dell'utilizzo dei prodotti, controllare sempre che siano ammessi sulla coltura, contro la malattia o il parassita che si vuole combattere e che l'autorizzazione Ministeriale sia ancora valida (sito consultabile www.fitorev.com). Le dosi e il tempo di carenza possono essere differenti tra i prodotti contenenti lo stesso principio attivo.

ATTENZIONE

Questo documento non deve in alcun caso essere considerato come un calendario dei trattamenti. Ad ogni stadio fenologico, sono necessarie osservazioni per giudicare l'opportunità a eseguire l'intervento suggerito.

LEGGERE BENE LE ETICHETTE

Modifiche limitazioni: E' vietato l'uso di Imidacloprid e Thiametoxam prima della fioritura

Per informazioni, rivolgersi ad uno degli uffici seguenti:

- Ufficio Servizi Fitosanitari Tel: 0165/275420
- Morgex Tel: 0165/800430
- Aymavilles Tel: 0165/902820
- Châtillon Tel: 0166/62889
- Arnad Tel: 0125/966438
- Pont-St-Martin uff. viticolo Tel: 0125/806843
- Pont-St-Martin Tel: 0125/807757

Siti WEB: www.regione.vda.it/agricoltura/imprese_e_agricoltori/fitosanitario/schedetrattamenti_i.asp oppure www.iaaosta.it