

PRODOTTI AUTORIZZATI SU PERO NELLE MISURE AGROAMBIENTALI

INSETTICIDI		
PRINCIPIO ATTIVO	Restrizioni nell'impiego	Note
ACETAMIPRID	Max 1 intervento a scelta tra Acetamiprid, Clotianidin, Imidacloprid e Thiametoxam. Con i Neonicotinoidi sono autorizzati al max 2 interventi all'anno.	E' vietato l'uso di Imidacloprid e Thiametoxam prima della fioritura.
IMIDACLOPRID		
THIAMETOXAM		
ABAMECTINA*		
BACILLUS THURINGEN		
BUPROFEZIN		
CLORANTRANILIPOLO (Rynaxypyr)	Max 2 volte all'anno	
CLORPIRIFOS-ETHYLE(1)	Max 3 volte all'anno in alternativa con il Fosmet.	
CLORPIRIFOS-METHYL(1)	Max 2 volte all'anno	
CIFLUTRIN	Max 1 volta all'anno con piretroidi	
DELTAMETRINA	Max 1 volta all'anno con piretroidi	
DIOTTIL SOLFOSUCCINATO DI SODIO		
EMAMECTINA	Max 2 volte all'anno	
ETOFENPROX	Max 1 volta x anno o in pre-fior. o da 10 a 15 gg prima della raccolta.	
FLONICAMID	Max 1 volta all'anno	
FOSMET (1)	Max 3 volte all'anno, alternativo al Chlorpirifos-ethyle	
OLIO MINERALE	Con Polithiol non trattare oltre gemma gonfia	
INDOXACARB*	Max 4 interventi all'anno	
PIRIMICARB*		
PYRIPROXYFEN*	Max 1 volta all'anno e prima della fioritura.	
PROTEINATO DI ZOLFO		
SALI POTASSICI		
SPINOSAD	Max 3 volte per anno	
SPIROTETRAMAT	Max 2 volte all'anno, uno per avversità.	
DIFLUBENZURON	Con il gruppo dei Chitino-inibitori sono autorizzati complessivamente 3 interventi all'anno.	
METOSSIFENOZIDE		
TEBUFENOZIDE		
VIRUS GRANULOSI		
(1) Tra clorpirifos etile, clorpirifos metile e fosmet sono ammessi al massimo 4 trattamenti all'anno		
ACARICIDI (Al max 1 intervento all'anno e su autorizzazione del Servizio Fitosanitario Reg.)		
CLOFENTEZINE°	° E' possibile miscelare questi p.a. con un adutticida o trovare miscele già pronte.	
EXITIAZOX°		
ETOXAZOLE°		
ACECHINOCIL		
PYRIDABEN*		
TEBUFENPIRAD*		

* Per l'acquisto e l'impiego di questi p.a. è necessario avere il patentino.

FUNGICIDI

	PRINCIPIO ATTIVO	Restrizioni nell'impiego	Note
	RAME E DERIVATI	Ammesse anche le formulazioni Xn di idrossido di rame	
	BOSCALID	Da solo o in miscela al massimo 3 volte all'anno.	
	DITIANON	(Dithianon +Pyraclostrobin non autorizzato causa R40)	
	DODINA	Non miscelare con oli e esterifosforici	
P	FLUAZINAM	Max 3 interventi all'anno. Attenzione! 60 gg di carenza.	
R	FLUDIOXONIL	Max 2 volte x anno, indipendentemente dall'avversità	
E	FOSETIL ALLUMINIUM	Intervenire in modo localizzato solo sulle piante colpite	
V	CAPTANO*	Max 1 volta x anno. Ammesso il 2° tratt. per le vari età che maturano dopo il 15 settembre	
E	POLISOLFURO di Ca		
T	PYRACLOSTROBIN+ BOSCALID*	Strobilurine al max 3 volte all'anno. Boscalid, da solo o in miscela al max 3 volte all'anno.	
V	TRIFLOXYSTROBIN	Strobilurine al max 3 volte all'anno.	
I	METIRAM	Metiram, Tiram e Ziram sono dei Ditiocarbammati, autorizzati al Max 3 volte e entro al 15 di giugno. Nei frutteti colpiti da maculatura bruna e limitatamente alle varietà più sensibili è consentito l'uso dei Ditiocarbammati fino a 40 giorni dalla raccolta. Cv sensibili: Abate Fetel, Conference, Decana, Kaiser, Passa Crassana, General Leclerc, Martin sec	
	ZIRAM*		
	TIRAM*		
C	CYPRODINIL	Anilinopirimidine al max 4 volte all'anno.	
U	CYPRODINIL + FLUDIOXONIL	Anilinopirimidine al max 4 volte all'anno.	
R	PYRIMETHANIL	Anilinopirimidine al max 4 volte all'anno.	
A	CIPROCONAZOLO	I.B.E. max 4 volte all'anno. Evitare le formulazioni Xn.	
T	DIFENOCONAZOLE	I.B.E. max 4 volte all'anno. Evitare le formulazioni Xn.	
I	FENBUCONAZOLO	I.B.E. max 4 volte all'anno. Evitare le formulazioni Xn.	
V	MICLOBUTANIL	I.B.E. max 4 volte all'anno. Evitare le formulazioni Xn.	
	PENCONAZOLE	I.B.E. max 4 volte all'anno. Evitare le formulazioni Xn.	
	TEBUCONAZOLO	I.B.E. max 4 volte all'anno. Evitare le formulazioni Xn.	
	TETRACONAZOLE	I.B.E. max 4 volte all'anno. Evitare le formulazioni Xn.	

* Per l'acquisto e l'impiego di questi preparati è necessario avere il patentino.

Al momento dell'acquisto e dell'utilizzo dei prodotti, controllare sempre che siano ammessi sulla coltura, contro la malattia o il parassita che si vuole combattere e che l'autorizzazione Ministeriale sia ancora valida (sito consultabile www.fitorev.com). Le dosi e il tempo di carenza possono essere differenti tra i prodotti contenenti lo stesso principio attivo.

ATTENZIONE

Questo documento non deve in alcun caso essere considerato come un calendario dei trattamenti. Ad ogni stadio fenologico, sono necessarie osservazioni per giudicare l'opportunità dell'intervento suggerito.

LEGGERE BENE LE ETICHETTE

Modifiche limitazioni: E' vietato l'uso di Imidacloprid e Thiametoxam prima della fioritura

Per situazioni particolari rivolgere le vostre richieste agli uffici elencati in seguito.

- Ufficio Servizi Fitosanitari Tel: 0165/275420
- Morgex Tel: 0165/800430
- Aymavilles Tel: 0165/902820
- Châtillon Tel: 0166/62889
- Arnad Tel: 0125/966438
- Pont-St-Martin uff. viticolo Tel: 0125/806843
- Pont-St-Martin Tel: 0125/807757

Siti WEB: www.regione.vda.it/agricoltura/imprese_e_agricoltori/fitosanitario/schedetrattamenti_i.asp oppure www.iaaosta.it