

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali -

UFFICIO SERVIZI FITOSANITARI IN COLLABORAZIONE CON I.A.R.

DISERBO DEL MELO 2017 (In base all'art. 19 - D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150)

INFESTANTI	CRITERI DI INTERVENTO	Principi attivi	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Graminacee e Dicotiledoni	<p><u>Interventi agronomici:</u> Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno Non sono ammesse: - Lavorazioni nelle interfile di impianti dotati di sistemi di irrigazione</p>		
	<p><u>Interventi chimici:</u> E' preferibile non effettuare interventi chimici nelle interfile. Sulle file è preferibile effettuare interventi localizzati, operando con microdosi su infestanti nei primi stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità senza superare la quantità massima di principio attivo distribuibile. Sono consigliate le applicazioni nel periodo autunnale. L'uso di diserbanti può essere opportuno quando : - Vi sia sulla fila una distanza tra pianta e piante inferiore a m 1,5 / 2. - Le piante abbiano apparato radicale superficiale (es. per il pero portannesti cotogni e BA29 - per il melo M9 e M26). - In alternativa alle lavorazioni quando queste potrebbero creare problemi di erosione (es. pendenze superiori al 5%).</p>	<p>Glifosate</p>	<p>Erbicida sistemico, non selettivo e non residuale. Attenzione! i prodotti commerciali a base di glifosate in associazione con il coformulante ammina di sego polietossilata, non possono essere utilizzati dopo il 22 maggio 2017.</p>
		<p>Carfentrazone</p>	<p>Agisce per contatto. Nei trattamenti autunnali intervenire in miscela con erbicidi sistemici alla dose di 0,3 l/ha, diluiti in 300-500 litri d'acqua. In primavera si interviene in miscela con erbicidi sistemici, su infestanti non eccessivamente sviluppate alla dose di 0,3 l/ha. La dose può essere ridotta a 0,25 L/ha qualora siano attuati più trattamenti allo scopo di realizzare un adeguato controllo delle eventuali rinascite delle infestanti. Come spollonante per ottenere risultati ottimali bisogna intervenire quando la vegetazione da eliminare presenta una lunghezza di 10-15 cm.</p>
Graminacee	Vedi nota precedente	Ciclossidim	Sistemico, di post-emergenza con poca persistenza nel terreno. La dose varia a seconda dell'infestante e del suo sviluppo. Per avere un risultato migliore è possibile frazionare l'applicazione, distanziando il trattamenti di 15-30 giorni, dimezzando la dose da distribuire prevista.

INFESTANTI	CRITERI DI INTERVENTO	Principi attivi	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Graminacee e Dicotiledoni	<u>PRODOTTI AUTORIZZATI SOLO NEI PRIMI 3 ANNI DI ALLEVAMENTO</u>	Oxadiazon	Agisce per contatto, ha una notevole persistenza sul terreno ma non viene assorbito per via radicale, evitare lavorazioni del terreno dopo l'applicazione. Intervenire a caduta foglie o prima della ripresa vegetativa in pre-emergenza alla dose di 2,5 l/ha.
		Oxifluorfen	Agisce principalmente per contatto. Da utilizzarsi a dosi ridotte 0,3-0,45 litri/ha e in miscela con un prodotto sistemico. Il prodotto va distribuito durante il periodo di dormienza. Usò limitato nel periodo tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio.
		Diflufenican + Glifosate	Prodotto altamente sistemico e residuale. Colpisce diverse malerbe annuali e alcune perennati. Per prodotti al 4% la dose è di 2-3 l/ha
		Pendimetalin	Prodotto da distribuire sul terreno, inibisce il germogliamento dei semi e lo sviluppo dei germinelli delle infestanti. Persiste nel terreno da 3 a 6 mesi. Intervenire prima della ripresa vegetativa, in pre-emergenza alla dose di 2 l/ha. Effettuare un solo intervento all'anno.
Spollonante	<u>Trattare i polloni lunghi al massimo 10-15 cm</u>	Pyraflufen-ethile*	Da usare in alternativa al carfentrazone. Agisce per contatto su numerose infestanti a foglia larga. Usare alla dose di 0,8 l/ha con prodotti commerciali al 2,6%, diluiti in 300lt/ha di acqua

LEGGERE BENE LE ETICHETTE

Al momento dell'acquisto e dell'utilizzo dei prodotti, controllare sempre che siano ammessi sulla coltura, contro la malattia o il parassita che si vuole combattere e che l'autorizzazione Ministeriale sia ancora valida (sito consultabile www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet). Le dosi e il tempo di carenza possono essere differenti tra i prodotti contenenti lo stesso principio attivo.

LIMITAZIONI PER GLI ADERENTI ALLA MISURA AGROAMBIENTALE 10.1.3

Consultare il Disciplinare di Produzione Integrata alla seguente pagina WEB:

http://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/disciplinare_produzione_integrata_i.aspx

Per informazioni, rivolgersi ad uno degli uffici seguenti:

- Ufficio Servizi Fitosanitari Tel: 0165/275420

- Arnad Tel: 0125/966438

- Morgex Tel: 0165/800430

- Pont-St-Martin uff. viticolo Tel: 0125/806843

- Aymavilles Tel: 0165/902820

- Pont-St-Martin Tel: 0125/807757

- Châtillon Tel: 0166/62889

Siti WEB: www.regione.vda.it/agricoltura/impres_e_agricoltori/fitosanitario/schedetrattamenti_i.asp oppure www.iraosta.it