

Avviso fitosanitario del 12 luglio 2018 - viticoltura
Vite – Tignole, botrite, peronospora e oidio

L'Assessorato Agricoltura e Ambiente della Regione autonoma Valle d'Aosta comunica quanto segue:

Lotta tradizionale

Tignole lotta precoce

Nelle zone di fondovalle, da **Pont-Saint-Martin ad Aymavilles**, è iniziato il volo della seconda generazione.

Nelle aree dove la pressione del parassita è più bassa non è necessario trattare.

Nelle aree storicamente soggette ad attacco ad esclusione di quelle dove si applica la lotta per confusione sessuale, è necessario intervenire con:

- **Clorantraliniprole** oppure **Metossifenozone** oppure **Indoxacarb**. **Entro la metà della prossima settimana.**

In alternativa a schiusura delle uova:

- **Tebufenozide** oppure **Emamectina** oppure **Spinosad** oppure **Bacillus turingensis** (il Bacillus va ripetuto dopo 10 giorni) **da metà della prossima settimana entro la seconda decade di luglio.**

N.B.: IL TRATTAMENTO CON QUESTI PRODOTTI VA ESEGUITO SOLO IN CASO DI PRESENZA CERTA DEL PARASSITA E NEL PERIODO INDICATO, IN QUANTO AGISCONO SOLO NEI PRIMISSIMI STADI DI SVILUPPO DELLE LARVE.

PER LA LOTTA TARDIVA ATTENDERE IL PROSSIMO COMUNICATO

Botrite della vite

Per limitare lo sviluppo della botrite è consigliato:

- evitare qualsiasi tipo di forzatura (concimazioni azotate e irrigazioni abbondanti);
- eseguire razionali potature verdi, che favoriscano l'aerazione a livello dei grappoli e la penetrazione degli eventuali trattamenti fungicidi.

Solo nelle zone particolarmente sensibili allo sviluppo di botrite e sulle varietà più sensibili, si consiglia di intervenire poco prima della chiusura dei grappoli con uno dei seguenti principi attivi:

Pyrimetanil oppure **Cyprodinil** oppure **Fludioxonil** oppure **Boscalid** oppure **Fluazinam**

Peronospora

Dove sono presenti infezioni, si consiglia di intervenire con uno dei seguenti prodotti sistemici:

Metalaxil M + Rame oppure **Benalaxil M + Rame**

Dove non sono presenti infezioni è sufficiente mantenere coperta la vegetazione con:

Rame+Cimoxanil oppure **Mandipropamide + Rame** oppure **Famoxadone + Cimoxanil** oppure **Dimetomorf + Rame**.

Oidio

Al trattamento antiperonosporico va miscelato uno dei seguenti prodotti antioidici:

Zolfo bagnabile oppure **Bupirimate** oppure **Spiroxamina** oppure un **IBE (Tetraconazolo** oppure **Penconazolo** oppure **Fenbuconazolo**).

E' importante alternare gli interventi antioidici sopra indicati con **lo zolfo in polvere**

LOTTA BIOLOGICA

Tignole Intervenire a inizio schiusura uova con **Bacillus turingensis** (il Bacillus va ripetuto dopo 10 giorni) oppure **Spinosad** da metà della prossima settimana entro la seconda decade di luglio.

Botrite Seguire le indicazioni riportate per la lotta tradizionale. I principi attivi utilizzabili sono:

Bacillus subtilis oppure **Bacillus amyloliquefaciens** oppure **Bicarbonato di Potassio**.

Peronospora Intervenire con un prodotto a base di **Rame**.

Oidio Miscelare al rame un prodotto a base di **zolfo bagnabile**. **Dopo 7 giorni eseguire uno zolfo in polvere**.

Al fine di preservare i pronubi (insetti impollinatori), prima di ogni intervento insetticida sfalciare le erbe fiorite sotto chioma e avvisare gli apicoltori che hanno arnie prossime ai vigneti.

Gli aderenti alla misura 10.1.3 devono controllare le limitazioni di utilizzo consultando il Disciplinare di Produzione Integrata sul sito regionale alla pagina:

http://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/disciplinare_produzione_integrata_i.as

Per maggiori informazioni:

Assessorato Agricoltura e Ambiente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Ufficio servizi fitosanitari, località Grande Charrière n. 66, Saint-Christophe (ispettore fitosanitario Rita Bonfanti, tel. 0165.275401/0165.275405 - responsabile tecnico Sandro Dallou, tel. 0165.275382/340.0634624)

www.regione.vda.it/agricoltura