Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali
Struttura Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari

**Avviso fitosanitario del 20 maggio 2019 – frutticoltura**

# Trattamento pomacee contro ticchiolatura e oidio

L'Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta informa che è necessario intervenire tempestivamente su pomacee, prima delle prossime precipitazioni, secondo le indicazioni elencate di seguito solo se non sono stati effettuati trattamenti contro ticchiolatura e oidio negli ultimi 7-8 giorni.
Nel caso in cui le piante siano protetta da un trattamento più recente, attendere le prossime piogge.

## POMACEE (lotta chimica)

### Ticchiolatura

**Ditianon**, oppure **Metiram** oppure **Fluazinam** oppure **Fosfonato di potassio** in miscela pronta con **Ditianon.**

Al prodotto di copertura è opportuno miscelare uno dei seguenti **IBE**:
**Difenoconazole** (tempo di retroattività 96 h),
tutti gli altri I.B.E (**Tebuconazolo, Penconazolo, Fenbuconazolo, Ciproconazolo, Miclobutanil, Tetraconazolo** (tempo di retroattività 72 h)
Per avere una buona efficacia l'intervento deve essere fatto entro il tempo di retroattività tipico per ogni prodotto calcolato dall'inizio della pioggia infettante ed è necessario attendere la completa asciugatura delle foglie.

### Oidio (SOLO MELO)

Alcuni IBE hanno un'azione collaterale antioidica, ma su varietà di melo particolarmente sensibili all'oidio, come renetta e jonagold, si consiglia di unire alla miscela anche **zolfo bagnabile** oppure **Bupirimate** oppure **Cyflufenamid** oppure **Fluxapiroxad.**

**Per una buona efficacia dei trattamenti è opportuno evitare di miscelare più di 2-3 prodotti. Controllare sempre la miscibilità tra i prodotti che si vogliono utilizzare.**

## POMACEE (lotta biologica)

**Ticchiolatura:** intervenire utilizzando le dosi da etichetta in relazione alla fase fenologica con prodotti a base di **Rame** oppure con **Zolfo** (registrato contro l'avversità e la coltura), oppure **Polisolfuro di calcio** (utilizzabile rigorosamente da solo anche su piante bagnate).

**Oidio (solo su melo)**: intervenire con **Polisolfuro di calcio** (da utilizzare rigorosamente da solo anche su piante bagnate) in alternativa si può usare lo **Zolfo** che si può miscelare con il Rame.

***ATTENZIONE: vige il divieto assoluto di trattare gli alberi in fiore con prodotti insetticidi, aficidi e acaricidi. Prioritaria è la salvaguardia degli alveari pertanto prima di trattare è obbligatorio sfalciare le erbe fiorite presenti sotto-chioma.***

***Si raccomanda il massimo rispetto delle indicazioni contenute nelle etichette dei formulati commerciali, ai sensi del PAN (Piano di azione nazionale per l'uso dei prodotti fitosanitari) che fanno riferimento alle distanze dai corsi d'acqua o altre aree naturali sensibili, soggette a tutela.***
***Rispettare inoltre le indicazioni contenute nell'allegato n. 1 alla DGR 342/2017 (cartellonistica e distanze minime dalle aree frequentate da popolazione e gruppi vulnerabili, avviso alla popolazione in caso da trattamenti in prossimità di aree residenziali).***

***Attenzione: rispettare rigorosamente tutte le indicazioni in etichetta relative ai dosaggi, alle modalità di impiego, ai tempi di carenza e alle distanze da aree sensibili.***

*Per maggiori informazioni:*
*Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, Ufficio servizi fitosanitari, località La Maladière – Rue de la Maladière n. 39, Saint-Christophe (responsabile tecnico Sandro Dallou, tel. 0165.275382/340.0634624 – ispettore fitosanitario Rita Bonfanti, tel. 0165.275405/0165.275401)*
*www.regione.vda.it/agricoltura*