Région Autonome Vallée d'Aoste — Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali
Struttura Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari

Avviso fitosanitario del 26 luglio 2019 – frutticoltura

Trattamento su pomacee contro ticchiolatura e oidio

L'Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta informa che è molto importante monitorare i propri frutteti e controllare le previsioni meteo per programmare al meglio gli interventi necessari a mantenere protetta la vegetazione da oidio e infezioni secondarie di ticchiolatura

Lotta Chimica

Ticchiolatura, utilizzare uno dei seguenti prodotti

- **Captano**: prodotto da prediligere nei frutteti con macchie di ticchiolatura secondaria**.** Attenzione, questo principio attivo non è miscibile con zolfo bagnabile, è sconsigliato su renetta perché riduce la rugginosità. (21 giorni di carenza)
- **Penthiopyrad**: principio attivo che svolge un'azione di contenimento anche contro l'oidio; Entrambi i principi attivi sopra elencati hanno un tempo di carenza di 21 giorni, prestare quindi molta attenzione al rispetto di tale tempo soprattutto sulle varietà precoci (per esempio Gala) .
- **Zolfo bagnabile** utilizzare formulati registrati anche contro la ticchiolatura. Da evitare con temperature elevate, può provocare ustioni)

Oidio (SOLO MELO)

Aggiungere alla miscela uno dei seguenti prodotti antioidici **zolfo bagnabile (**non usare con il captano e con temperature elevate, può provocare ustioni**)** oppure **Bupirimate** oppure **Cyflufenamid** oppure **Fluxapiroxad.**

Lotta biologica

Ticchiolatura e Oidio

- **Zolfo bagnabile** agisce contro oidio oppure contro ticchiolatura e oidio a seconda della formulazione scelta. Scegliendo una formulazione registrata anche contro ticchiolatura è possibile combattere le due avversità evitando di eseguire miscele (attenzione, non utilizzare con temperature superiori a 30°c e su piante bagnate). 5 giorni di carenza;
- **Rame**: agisce solo contro ticchiolatura, è quindi necessario utilizzarlo in miscela con zolfo. Consigliato solo su renetta in quanto provoca rugginosità sul frutto. In prossimità della maturazione si raccomanda di scegliere prodotti non colorati e con i tempi di carenza più brevi (in commercio esistono, infatti, formulati di vario tipo, colorati e non, e con tempi di carenza che variano da 5 a 20 giorni);
- **Bicarbonato di potassio**, al massimo 5 applicazioni all'anno a partire da frutto noce fino al raggiungimento di metà della pezzatura finale (1 giorno di carenza).

ATTENZIONE: vige il divieto assoluto di trattare gli alberi in fiore con prodotti insetticidi, aficidi e acaricidi. Prioritaria è la salvaguardia degli alveari pertanto prima di trattare è obbligatorio sfalciare le erbe fiorite presenti sotto-chioma.
Si raccomanda il massimo rispetto delle indicazioni contenute nelle etichette dei formulati commerciali, ai sensi del PAN (Piano di azione nazionale per l'uso dei prodotti fitosanitari) che fanno riferimento alle distanze dai corsi d'acqua o altre aree naturali sensibili, soggette a tutela. Rispettare inoltre in modo rigoroso i dosaggi, le modalità di impiego e i tempi di carenza.
Rispettare inoltre le indicazioni contenute nell'allegato n. 1 alla DGR 342/2017 (cartellonistica e distanze minime dalle aree frequentate da popolazione e gruppi vulnerabili, avviso alla popolazione in caso da trattamenti in prossimità di aree residenziali).

Per maggiori informazioni:
Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, Ufficio servizi fitosanitari, località La Maladière – Rue de la Maladière n. 39, Saint-Christophe (responsabile tecnico Sandro Dallou, tel. 0165.275382/340.0634624 – ispettore fitosanitario Rita Bonfanti, tel. 0165.275405/0165.275401)
www.regione.vda.it/agricoltura