Assessorato Agricoltura e Risorse naturali
Struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali

Avviso fitosanitario del 19 febbraio 2024 – frutticoltura

Drupacee, primi interventi

Si informano i frutticoltori che nella fase di prefioritura delle drupacee è opportuno intervenire preventivamente contro alcune avversità.

Contro Cocciniglia (su tutte le drupacee)

Questo trattamento può essere eseguito solo entro la fase di gemme gonfie ed è autorizzato sia nella difesa integrata sia nel biologico

Impiegare **olio minerale** oppure **olio minerale+zolfo**.

Contro bolla e corineo (su Pesco)

Prima del germogliamento, è sufficiente intervenire preventivamente con un **prodotto rameico** (**i prodotti rameici hanno una attività preventiva su diverse malattie fungine e sono miscibili con l'olio).**

In caso di precipitazioni in fase di rottura delle gemme è invece preferibile intervenire come segue

Difesa integrata	Biologico
- **Ziram** * (autorizzato anche anche per il corineo del ciliegio) - **Captano*** (autorizzato anche per il corineo dell'albicocco e del ciliegio) - **Dodina** (non miscibile con l'olio –	- **Rame** (utilizzare la dose indicata per i trattamenti invernali, seguendo le indicazioni riportate in etichetta riguardo la relativa fase fenologica) - **Polisolfuro di calcio*** (non miscelabile con altri prodotti – efficace anche contro le cocciniglie)

Contro monilia (su pesco, albicocco, susino e ciliegio)

Per lo sviluppo della monilia è sufficiente la rugiada, pertanto si consiglia di intervenire in fase pre-fiorale o a caduta petali con uno dei prodotti indicati

Difesa integrata	Biologico
- **Cyprodinil (non autorizzato su ciliegio)** - **Fenexamide** - **Fenpirazamina** - **Boscalid (non autorizzato su susino)**	- **Rame** (in prossimità della fioritura le dosi utilizzabili sono più basse rispetto a quelle relative al periodo di riposo vegetativo - seguire quindi con attenzione le indicazioni riportate in etichetta in base alla fase fenologica) - **Bacillus subtilis** - **Bacillus amyloliquefaciens** - **Bicarbonato di potassio (no susino, ciliegio)**

Attenzione! In base a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2018/1981 del 13 dicembre 2018 e dal Comunicato del Ministero della Salute del 31 gennaio 2019 per i **prodotti rameici** vi è il seguente vincolo: non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il limite massimo di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

Prioritaria è la salvaguardia degli alveari pertanto prima di trattare è obbligatorio sfalciare le erbe fiorite presenti sotto-chioma.
Divieto assoluto di utilizzare da inizio fioritura fino a caduta petali prodotti insetticidi, aficidi e acaricidi, diserbanti e disseccanti.

Limitazioni nell'uso dei fitofarmaci in prossimità di zone frequentate da popolazione e gruppi vulnerabili

*** I principi attivi evidenziati in grigio non sono utilizzabili a meno di 30 metri delle zone frequentate da popolazione e gruppi vulnerabili in quanto tutti i prodotti in commercio contengono almeno una delle frasi H che ne vietano l'impiego in tale fascia. Per gli altri (quelli non evidenziati) è disponibile sul mercato almeno un prodotto commerciale che non ha restrizioni d'impiego, in ogni caso, prima di qualsiasi trattamento in prossimità nelle zone di cui sopra è sempre necessario verificare in etichetta l'assenza delle frasi H che determinano limitazioni (come da tabella di conversione contenuta nell'allegato 1 alla DGR 342/2017 disponibile sul sito web della Regione Autonoma valle d'Aosta)**

Per maggiori informazioni:
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, Ufficio servizi fitosanitari, località La Maladière – Rue de la Maladière n. 39, Saint-Christophe (responsabile tecnico Sandro Dallou, tel. 0165.275382-86/340.0634624 – ispettore fitosanitario Rita Bonfanti, tel. 0165.275405/0165.275420)
www.regione.vda.it/agricoltura

Comunicazione a cura dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, Ufficio servizi fitosanitari, in collaborazione con l'Institut Agricole Régional