



ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

UFFICIO SERVIZI FITOSANITARI

In collaborazione con:

ISTITUT AGRICOLE REGIONAL

TRATTAMENTI DI DIFESA INTEGRATA SU VITE 2024

(In base all'art. 19 - D.Lgs. 14 agosto 2022 n. 150)



PRESCRIZIONI PER I TRATTAMENTI

- DURANTE IL PERIODO DELLA FIORITURA È VIETATO L'UTILIZZO DI INSETTICIDI, ACARICIDI, DISECCANTI E DISERBANTI IN QUANTO TOSSICI PER GLI IMPOLLINATORI. IN PRE FIORITURA EVITARE L'IMPIEGO DI PRODOTTI TOSSICI O AD AZIONE REPELLENTE PER LE API E DI QUELLI AD ELEVATA PERSISTENZA O SISTEMICI.
- IN FIORITURA È CONSENTITO L'UTILIZZO DI FUNGICIDI SOLO IN CASO DI CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI MALATTIE CRITTOGAMICHE ATTENENDOSI ALLE INDICAZIONI DELL'UFFICIO SERVIZI FITOSANITARI DIRAMATE CON APPOSITI AVVISI O A SISTEMI DI PREVISIONE E AVVERTIMENTO MESSI IN ATTO A LIVELLO AZIENDALE I CUI DEVE ESSERE TENUTA REGISTRAZIONE.
- È CONSENTITO L'IMPIEGO DI FITOREGOLATORI IN FIORITURA SOLO SE AUTORIZZATO IN ETICHETTA.
- IN CASO DI UTILIZZO DI INSETTICIDI, ACARICIDI, DISECCANTI E DISERBANTI È OBBLIGATORIO SFALCIARE LE ERBE SPONTANEE FIORITE PRESENTI SOTTOCHIOMA ANCHE FUORI DAL PERIODO DELLA FIORITURA DELLA COLTURA.

Dal 1° agosto di ogni anno e fino alla vendemmia, i conduttori dei vigneti hanno l'obbligo di comunicare, attraverso apposita email attivata presso il Dipartimento Agricoltura, i trattamenti che intendono eseguire con insetticidi o acaricidi. La comunicazione deve essere fatta in giorno feriale e con almeno quattro giorni d'anticipo rispetto alla presunta data di esecuzione del trattamento per permettere agli apicoltori di spostare le arnie collegandosi al seguente link:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/comunicazione_trattamenti_i.aspx



<ul style="list-style-type: none"> • EVITARE LE MISCELE CON PIÙ PRODOTTI FITOSANITARI INSETTICIDI E FUNGICIDI IN QUANTO AUMENTA L'EFFETTO TOSSICO NEI CONFRONTI DEI PRONUBI. • TRATTARE NELLE PRIME ORE DEL MATTINO O IN QUELLE IN TARDA SERATA, EVITANDO LE ORE DI MASSIMO VOLO DELLE API. • NEL CASO SI EFFETTUINO TRATTAMENTI IN FIORITURA, AUTORIZZATI PREVENTIVAMENTE DAL SERVIZIO FITOSANITARIO ATTRAVERSO UN COMUNICATO, INTERVENIRE SEMPRE VERSO SERA PER EVITARE CHE LE API E GLI ALTRI IMPOLLINATORI SIANO ESPOSTI AL CONTATTO DIRETTO CON IL PRODOTTO UTILIZZATO. 	
<p>PRIMA DI OGNI TRATTAMENTO, CONTROLLARE CHE I PRODOTTI COMMERCIALI CHE SI INTENDONO UTILIZZARE NON SIANO STATI REVOCATI, SIANO REGISTRATI SULLA COLTURA DA TRATTARE E CHE L'UTILIZZO SIA CONSENTITO CONTRO L'ORGANISMO NOCIVO CHE SI VUOLE COMBATTERE.</p>	
<p>RISPETTARE RIGOROSAMENTE LE INDICAZIONI CONTENUTE IN ETICHETTA E IN PARTICOLARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LE DOSI E LE MODALITA' DI PREPARAZIONE E DI IMPIEGO DELLA MISCELA. • I TEMPI DI CARENZA (*) E DI RIENTRO(**) • IL RISPETTO DELLE FASCE (Distanze) DAI CORSI D'ACQUA. 	
<p>ADOTTARE TUTTE LE MISURE NECESSARIE PER RIDURRE I FENOMENI DI DERIVA:</p> <p>SOTTOPONENDO AL CONTROLLO FUNZIONALE ED EFFETTUANDO UNA COSTANTE MAUNTENZIONE DELLE MACCHINE IRRORATRICI, COME PREVISTO DAL PIANO DI AZIONE NAZIONALE (PAN).</p> <p>NON TRATTANDO IN PRESENZA DI VENTO</p> <p>TRATTANDO I FILARI A CONFINE SOLO DALL'ESTERNO VERSO L'INTERNO</p> <p>UTILIZZANDO OVE POSSIBILE UGELLI ANTIDERIVA.</p>	
<p>COME PREVISTO DAL PAN SULL'USO SOSTENIBILE DEI FITOFARMACI, È VIETATO L'UTILIZZO DI PRODOTTI CON PARTICOLARI FRASI DI RISCHIO A MENO DI 30 METRI DALLE ZONE FREQUENTATE DA POPOLAZIONE E GRUPPI VULNERABILI (LE FRASI DI RISCHIO VIETATE SONO INDICATE NELL'ALLEGATO ALLA DGR 342/2017)</p> <p>APPLICARE I CARTELLI DI PERICOLO NELLE ZONE TRATTATE SECONDO QUANDO INDICATO DALLA DGR 342/2017</p>	
<p>I contravventori saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 27 della lr 56/82 modificata dalla lr 78/92 e dalla lr n. 3/2020 e alle sanzioni previste dal D. lgs 150/2012.</p> <p>(*) tempo di carenza: il numero minimo di giorni che deve intercorrere tra la data del trattamento e la data di raccolta dei prodotti agricoli.</p> <p>(**) tempo di rientro: numero di giorni che deve intercorrere tra la data del trattamento e la data in cui l'operatore può rientrare nel campo trattato</p>	

ATTENZIONE! Per i principi attivi evidenziati in grigio, non esistono prodotti commerciali utilizzabili a meno di 30 metri dalle zone frequentate da popolazione e gruppi vulnerabili. Per quelli non evidenziati, è disponibile sul mercato almeno un prodotto commerciale che non ha restrizioni d'impiego.

PERONOSPORA

Per gli avvisi contro questo patogeno si utilizzano modelli previsionali che si basano sui dati meteo rilevati, sullo sviluppo fenologico della pianta e sulle previsioni meteo.

- ⇒ Per il primo intervento dell'infezione primaria la regola dei tre 10 va sempre contestualizzata. Ad esempio con inverni e primavere piovose è bene essere più attenti e tempestivi nel trattamento. Viceversa si può attendere.
- ⇒ Le infezioni secondarie possono iniziare con una bagnatura, di foglie e grappoli, di sole 2 ore a temperature di 22-24 °C.
- ⇒ Fasi critiche: grappoli separati, prefioritura, allegagione, pre-chiusura grappolo.
- ⇒ FINO ALLA FIORITURA eseguire un trattamento cautelativo con fungicidi a lunga persistenza anche di copertura, oppure attendere una pioggia infettante per poi intervenire, al più presto, con miscele contenenti prodotti curativi.
- ⇒ POST FIORITURA: mantenere la vegetazione protetta con prodotti di copertura rameici soli o in miscela con preparati endoterapici.
- ⇒ FOSFITI: l'utilizzo nei primi trattamenti, fino a grano di pepe, stimola le autodifese della pianta. Per evitare problemi di fitotossicità, se si usano in miscela con il rame, quest'ultimo va utilizzato a una dose ridotta. Non miscelare con oli, nel caso, eseguire delle prove.

PRINCIPI ATTIVI	AZIONE E CONSIGLI
Folpet, Fluazinam Ditianon, Metiram	Di copertura da utilizzare a inizio stagione. Ditianon e Metiram sono consigliati fino all'allegagione. Metiram revocato termine utilizzo 28-11-2024
Zoxamide	Di copertura , si lega alle cere. Miscelare con prodotti ad azione diversa.
Ametoctradin	Di copertura , si lega alle cere, persistenza 10-12 gg.
Fluopicolide	Di copertura, translaminare. Fluopicolide in alternativa a Metalaxil
Fosfonato di K Fosfonato di Sodio	Sistemico. Da miscelare con prodotti di copertura (Rame, Metiram, Folpet). Utilizzabile da inizio stagione fino a prechiusura grappolo.
Fosetil di alluminio	Sistemico. Da miscelare con prodotti di copertura. Il prodotto non è compatibile con ossicloruri e idrossidi rameici. Non miscelare a olii, concimi fogliari, fitostimolanti e fitoregolatori. Se usato con l'antioidico Spiroxamina, sciogliere prima quest'ultima.
Oxatiaprolin	Translaminare, sistemica acropeta. Azione preventiva. Miscelare con prodotti ad azione diversa.
Cyazofamid Amisulbron	Di copertura, translaminari , con una persistenza di 8-14 gg. Cyazofamid si trova anche in miscela con il Fosfonato di sodio
Pyraclostrobin	Di copertura con una buona persistenza d'azione 8-10 gg.
Cimoxanil	Citotropico e traslaminare con una persistenza d'azione di 4-5 giorni.
Benthiovalicarb Dimetomorf Iprovalicarb Mandipropamide Valiphenal	Citotropici, translaminari e localmente sistemici. La persistenza d'azione è di circa 10-12 giorni, mentre l'azione curativa si esplica entro 2-3 giorni dall'inoculo del fungo. Benthiovalicarb termine utilizzo 13-12-2024
Benalaxil M Metalaxil M Metalaxyl	Sistemici che vanno utilizzati nelle fasi più critiche (prefioritura) in miscela con prodotti di copertura (rame, folpet). Metalaxil in alternativa a Fluopicolide
Prodotti rameici	Di copertura , (6-8 gg), dilavabile con 20 mm di pioggia. Se fa freddo, umido e su vitigni sensibili (Nebbiolo, Moscato), può causare ustioni. Attenzione, autorizzati da etichetta 4 kg di rame metallo/ha/anno o 28 kg/Cu/ha in 7 anni.

OIDIO

- ⇒ FASI CRITICHE: a partire da 5 cm di germoglio, massima sensibilità in prefioritura, post fioritura e fino all'invaiaura.
- ⇒ Usare lo zolfo in polvere alla dose di 3/4 kg ogni 1000 metri quadrati.
- ⇒ Dal germogliamento alla prefioritura intervenire preventivamente con anti-oidici di copertura.
- ⇒ Dalla prefioritura alternare anti-oidici sistemici e zolfo.
- ⇒ Per ridurre il rischio d'insorgenza di resistenze alternare principi attivi con diverso meccanismo d'azione.
- ⇒ Nella fase di prechiusura del grappolo preferire applicazioni con zolfo polverulento.
- ⇒ In caso di forte pressione della malattia aggiungere zolfo bagnabile al prodotto sistemico.
- ⇒ Tutti i prodotti antioidici hanno azione principalmente preventiva.

PRINCIPI ATTIVI	AZIONE E CONSIGLI
Zolfo (Bio)	Di copertura: agisce con temperature superiori ai 12°C, sopra i 35°C può causare ustioni. L'attività diminuisce con più umidità. In polvere secca dura circa 10-15 gg, le formulazioni bagnabili durano solo 7-8 gg.
Laminarina (Bio) Cos-oga (Bio) Cerevisane (Bio)	Stimolatori delle difese sono da usare preventivamente. La laminarina è utilizzabile da chiusura grappolo fino a maturazione.
Ampelomyces quisqualis (Bio)	Di copertura Si usa in miscela con olio min estivo o con pinolene o con un bagnante silconico. Va bene tutto l'anno ma l'ideale è da chiusura grappolo all'invaiaura.
Bicarbonato di Potassio (Bio)	Di copertura , dalla comparsa dei primi sintomi con cadenza di 7-10 gg. Si <u>sconsiglia</u> l'utilizzo del Bicarbonato di K sul Moscato.

Bacillus pumilis (Bio)	Preventivo
Olio essenziale di arancio (Bio)	Di copertura , va usato a inizio infezione. Non usare su piante sofferenti da stress idrico e su piante bagnate.
Penconazolo Tetraconazolo Difenconazolo Mefentrifluconazolo, Tebuconazolo,	Sistemici. Gruppo degli IBE. Mantengono una copertura della vegetazione per 10-14 gg. Per ridurre il rischio d'insorgenza di resistenze è bene alternare gli IBE con principi attivi a diverso meccanismo d'azione.
Fluxapyroxad	Sistemico. Preventivo curativo
Pyraclostrobin Trifloxystrobin Azoxystrobin	Di copertura, translaminari. Strobilurine coprono 10-14 giorni. Trifloxystrobin e Pyraclostrobin agiscono anche contro il Black Rot.
Boscalid	Di copertura, translaminare. Azione anche antibotritica. Usare nella fase di pre-chiusura del grappolo.
Bupirimate	Di copertura citotropico e traslaminare. E' meglio usarlo da inizio germogliamento fino a fine fioritura. Copre circa 10 giorni.
Proquinazid	Preventivo di contatto
Metrafenone Pyriofenone	Di copertura translaminare. Resiste al dilavamento. Copre 8-10 gg. Se si miscela con prodotti a base di zolfo, metiram, cimoxanil, fosetil-alluminio e folpet è meglio preparare la miscela in agitazione continua.
Meptildinocap	Di copertura con una durata di 10 giorni.
Ciflufenamid	Di copertura, si lega alle cere. Usare da inizio fiore a ingrossamento acini. Copre 10-12 gg.
Spiroxamina	Notevole sistemica acropeta. Non è influenzato dalla temperatura. Copre per circa 10-14 giorni. In caso di miscela con Fosetyl-AI è consigliabile inserire Spiroxamina per prima.

BOTRYTIS/ MUFFA GRIGIA

- ⇒ **INTERVENTI AGRONOMICI:** evitare qualsiasi pratica di forzatura come le concimazioni azotate e le irrigazioni (ammesse quelle di soccorso); eseguire razionali potature verdi per favorire l'aerazione dei grappoli e la penetrazione dei trattamenti; limitare le lesioni al grappolo di varia origine (decapugliatore, grandine, oidio e tignole).
- ⇒ **INTERVENTI CHIMICI:** nei vigneti ad alto rischio e per le varietà sensibili eseguire 2 trattamenti; il primo, quello fondamentale, va fatto entro la chiusura del grappolo, mentre il secondo, se necessario, a 3-4 settimane prima dalla vendemmia.

PRINCIPI ATTIVI	AZIONE E CONSIGLI
Bacillus amyloliquefaciens * Bacillus subtilis Aureobasidium pullans Bicarbonato di potassio Saccharomyces cerevisiae Trichoderma atroviride Metschnikowia fructicola	Di copertura. Prodotti biologici utilizzabili da fine fioritura fino a inizio maturazione. Prodotti non miscibili, attendere 3 gg prima di utilizzare altri prodotti. *Registrato anche per il controllo del marciume degli acini. Si <u>sconsiglia</u> l'utilizzo del Bicarbonato di K sul moscato. Saccharomyces: preventivo, utilizzabile 6 volte da piena fioritura a maturazione. Trichoderma: preventivo, utilizzare da piena fioritura. Metschnikowia: preventivo, utilizzabile max 6 volte da piena fioritura a maturazione
Eugeniolo+Geraniolo+Timolo (Bio)	Di copertura utilizzabile da fioritura a raccolta.
Pythium oligandrum cep M1 (Bio)	Preventivo
Pyrimetanil, Fenpirazamide	Di copertura translaminare
Fenexamid,	Di copertura. Si fissa alle cere, è poco dilavabile.
Cyprodinil, fludioxonil	Di copertura translaminare. Registrato anche per il controllo del marciume degli acini.
Boscalid	Di copertura translaminare E' meglio usarlo in prechiusura grappolo.
Fluazinam	Di copertura.

MAL DELL'ESCA

INTERVENTI AGRONOMICI:

- ⇒ In caso di piante attaccate procedere all'estirpazione e alla bruciatura delle stesse.
 - ⇒ In caso di piante parzialmente infette, segnare i ceppi malati con un nastro, procedere all'asportazione delle parti invase dal fungo attraverso una potatura invernale tardiva (mese di marzo), allevare, se possibile dal legno sano, un nuovo germoglio e disinfettare la ferita.
 - ⇒ In estate, segnare le piante sintomatiche che andranno potate separatamente dalle altre per limitare la diffusione della malattia.
- INTERVENTI CHIMICI:** Gli attrezzi da taglio vanno disinfettati a scopo preventivo, con sali quaternari di ammonio o con una soluzione alla concentrazione all'8% di ipoclorito di sodio (candeggina).

PRINCIPI ATTIVI	AZIONE E CONSIGLI
Trichoderma atroviride (Bio)	Trattamenti da eseguire al bruno, entro 15 giorni dalla potatura.
Trichoderma asperellum + Trichoderma gamsii (Bio)	
Boscalid+Pyraclostrobin	

TIGNOLE

- ⇒ SONO SCONSIGLIATI INTERVENTI CHIMICI CONTRO LA PRIMA GENERAZIONE.
- ⇒ SOGLIA D'INTERVENTO in seconda generazione nelle zone infestate: alla presenza di uova o fori di penetrazione; nei vigneti normalmente indenni: al superamento della soglia del 5% d'attacco.
- ⇒ Il momento più opportuno per l'intervento sulla SECONDA GENERAZIONE è indicato dall'Ufficio Servizi Fitosanitari.
- ⇒ Indirizzare preferibilmente il trattamento sui grappoli e per una migliore efficacia trattare solo per questo parassita.

PRINCIPI ATTIVI	AZIONE E CONSIGLI
Confusione sessuale (Bio)	Applicare i dispenser prima dell'inizio del volo della prima generazione.
Azadiractina A	Ingestione. Sistemico. Agisce come i regolatori di crescita
Bacillus thuringensis (Bio)	Ingestione. Applicare a uovo testa nera Persiste 4-10 gg. Usare elevati volumi di acqua. Facilmente dilavabile, ripetere il trattamento dopo 10-15 gg.
Spinosad (Bio)	Ingestione e contatto - Applicare a schiusura delle uova.
Clorantroliniprole	Ingestione e contatto. Applicare a inizio ovo-deposizione.
Metossifenoziide	Ingestione e contatto. Applicare a inizio ovo-deposizione.
Tebufenozide	Ingestione. Applicare a uovo testa nera Persiste circa 21 giorni.
Spinetoram	Ingestione e contatto. Applicare a schiusura delle uova.
Emamectina	Ingestione e contatto. Rapido potere abbattente. Applicare a uovo testa nera. Agisce anche sugli stadi larvali più avanzati.

CICALINA DELLA FLAVESCENZA DORATA (*Scaphoideus titanus*)

- ⇒ TRATTARE SOLO CON PRODOTTI AUTORIZZATI E SEGUENDO LE INDICAZIONI DIRAMATE DALL'UFFICIO SEVIZI FITOSANITARI CON APPOSITO AVVISO
- ⇒ **NELLE ZONE FOCOLAIO ESEGUIRE 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO CONTRO QUESTO INSETTO**
Primo intervento: a schiusura uova su neanidi tra 1° e 2° età, evitando di intervenire durante la fioritura.
Secondo intervento: utilizzare un prodotto adulticida dopo circa 15 - 25 giorni dal primo trattamento (etofenprox o piretrine) ~.
Nelle zone focolaio la lotta al vettore di Flavescenza dorata è obbligatoria.

PRINCIPI ATTIVI	AZIONE E CONSIGLI
Sali potassici di acidi grassi (Bio)	Contatto Prodotto biologico di copertura.
Olio essenziale di arancio dolce (Bio)	Contatto Agisce sulle forme giovanili e su adulti con corpo molle.
Beauveria bassiana (Bio)	Contatto: 1° intervento a 1 mese da schiusura uova, 2° dopo 7-10 giorni
Piretrine (Bio)	Contatto Trattare preferibilmente la sera bagnando bene le piante.
Azadiractina (Bio)	Ingestione. Sistemico. Agisce come i regolatori di crescita
Acetamiprid	Ingestione. Prodotto citotropico-translaminare con elevata sistemica
Flupyradifurone	Ingestione e contatto. Sistemico. Agisce sia su forme adulte sia giovanili. Non miscelare con fungicidi IBE
Esfenvalerate	Piretroide. Ingestione e contatto elevato potere abbattente
Etofenprox	Piretroide. Ingestione e contatto elevato potere abbattente, efficace contro forme adulte.
Deltametrina	Piretroide. Ingestione e contatto elevato potere abbattente.
Lambdacialotrina	Piretroide. Ingestione e contatto elevato potere abbattente

NOTTUE

- ⇒ TRATTARE SOLO NEI VIGNETI CHE NEGLI ULTIMI ANNI HANNO AVUTO DEI DANNI AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 2-3% DI GEMME DANNEGGIATE
- ⇒ IMPEDIRE LA RISALITA DELLE NOTTUE ATTRAVERSO L'USO DI COLLE ENTOMOLOGICHE O DEI CONI ROVESCIA TI
- ⇒ IPOTIZZARE UNA RACCOLTA MANUALE NOTTURNA

PRINCIPI ATTIVI	AZIONE E CONSIGLI
Bacillus thuringensis	
Deltametrina	Alcuni formulati (Meteor, ecc.) sono registrati contro l'avversità (non presente nelle misure agroambientali)

ESEMPIO DI STRATEGIA PER L'UTILIZZO DI ALCUNI DEI PRODOTTI SOPRA INDICATI

FASE FENOLOGICA	OIDIO	PERONOSPORA	ALTRO
FINO A GEMMA COTONOSA	<u>OLIO MINERALE+ZOLFO</u>		<u>NOTTUE</u>
DA GERMOGLI 10-15 CM A GRAPPOLI SEPARATI	ZOLFO TRIFLOXYSTROBIN BUPIRIMATE SPIROXAMINA	RAME RAME+ZOXAMIDE RAME + FOSETIL AL	<u>ESCORIOSI</u> <u>BOROCARENZE</u>
PREFIORITURA	ZOLFO <u>TRIFLOXYSTROBIN</u> IBE BUPIRIMATE SPIROXAMINA CIFLUFENAMID	RAME + FOSETIL AL <u>CIMOXANIL+ FOSETIL AL</u> CYAZOFAMIDE FLUOPICOLIDE + FOSETIL AL <u>DIMETOMORF+ZOXAMIDE</u> Con forte pressione della malattia <u>BENALAXIL M+ FOLPET</u> METALAXIL M + RAME	<u>ESCORIOSI</u> <u>BOROCARENZE</u>
FIORITURA	Per salvaguardare le api, è vietato l'impiego di insetticidi, aficidi, acaricidi e diserbanti. L'impiego dei fungicidi, elencati nella fase di fine fioritura quando sono la maggior parte delle caliptré, sono cadute, è consentito solo se vi sono rischi d'infezione fungina. In ogni caso, attenersi alle indicazioni dell'Ufficio Servizi Fitosanitari o ai sistemi di previsione e avvertimento messi in atto a livello aziendale.		
META' FIORITURA	<u>ZOLFO IN POLVERE</u>		
ALLEGAGIONE	ZOLFI IBE BUPIRIMATE SPIROXAMINA CIFLUFENAMID METRAFENONE	<u>FAMOXADONE+CIMOXANIL</u> DIMETOMORF + RAME MANDIPROPAMIDE + RAME CIMOXANIL+RAME <u>RAME + IPROVALICARB</u> Con forte pressione della malattia BENALAXIL M+FOLPET METALAXIL M + RAME	CONCIME FOGLIARE CON <u>MAGNESIO</u> <u>CICALINE</u> <u>TIGNOLA</u> <u>MUFFA GRIGIA</u>
INVAIATURA Quando gli acini diventano traslucidi e cambiano colore a seconda della varietà	ZOLFO BAGNABILE	RAME	CONCIME FOGLIARE CON <u>POTASSIO</u> <u>MUFFA GRIGIA</u>

Il numero dei trattamenti necessari e il periodo ideale d'intervento variano secondo l'andamento meteo.

LIMITAZIONI PER GLI ADERENTI ALLA MISURA AGROAMBIENTALE 10.1.3

Consultare il Disciplinare di Produzione Integrata alla seguente pagina WEB:

http://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/disciplinare_produzione_integrata_i.aspx

Per informazioni rivolgersi ai seguenti uffici:

Ufficio Servizi Fitosanitari ☎ – tecnico: 0165/275382 segreteria: 0165/275211 email : s.dallou@regione.vda.it , r.bonfanti@regione.vda.it			
Pont-Saint-Martin ufficio viticolo	tel. 0125/806843	Aymavilles	tel. 0165/902820
Châtillon	tel. 0166/62889	Morgex	tel. 0165/800430

Siti WEB: www.regione.vda.it/agricoltura/imprese_e_agricoltori/fitosanitario/schedetrattamenti_i.asp oppure www.iaraosta.it