

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali
Struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali

Avviso fitosanitario del 12 marzo 2025 – frutticoltura Pomacee, primi interventi


Si informano i frutticoltori che è il momento di pianificare gli interventi fitosanitari di fine inverno per prevenire malattie e attacchi parassitari su pomacee.

I trattamenti indicati in questo avviso devono essere eseguiti alle fasi fenologiche descritte nelle tabelle, tenendo conto che la data di raggiungimento di tali fasi è varia da frutteto a frutteto in base al microclima.



Strategie proposte

A) Due trattamenti, il primo nella fase fenologica di **gemma gonfia**, il secondo tra **orecchiette di topo e bottoni rosa** con i seguenti prodotti (antifungini e insetticidi) miscelati tra loro:

Primo trattamento

Difesa integrata	Difesa biologica	
<ul style="list-style-type: none"> - Olio minerale (*) al 2,5% (contro le cocciniglie) in miscela con - Rame (antiticchiolatura) 	<ul style="list-style-type: none"> - Olio minerale al 2,5%) in miscela con - Rame (antiticchiolatura) Oppure - Polisolfuro di calcio (da impiegarsi da solo) 	


Secondo trattamento

Difesa integrata	Difesa biologica	
<ul style="list-style-type: none"> - Bupirimate o Cyflufenamid (antioidico) in miscela con - Dodina **oppure - Pyrimethanil (antiticchiolatura) in miscela con uno dei seguenti aficidi: - Flonicamid oppure Pirimicarb (afidi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Zolfo (antioidico) in miscela con - Rame (antiticchiolatura) - Azadiractina (aficida) 	 

(*) Se si impiega il prodotto **Polithiol** (olio minerale più zolfo), questo deve essere distribuito entro e non oltre la fase di **punte verdi** per evitare bruciature ai tessuti vegetali.

(**) Dodina deve essere utilizzata dopo 15 giorni dal trattamento con olio minerale

B) Un solo trattamento da collocare tra **orecchiette di topo e bottoni rosa** con i seguenti prodotti (antifungini e insetticidi) miscelati tra loro:

Difesa integrata	Difesa biologica	
<ul style="list-style-type: none"> - Olio minerale (*) al 2% (contro le cocciniglie) in miscela con - Bupirimate o Cyflufenamid (antiodico) e - Pyrimethanil (antiticchiolatura) e con - Flonicamid oppure Pirimicarb (aficida) 	<ul style="list-style-type: none"> - Zolfo (antiodico) in miscela con - Rame (antiticchiolatura) e con - Azadiractina (aficida) 	

(*) Se si usa **Polithiol** (olio minerale più zolfo), questo deve essere distribuito entro e non oltre la fase di **punte verdi** per evitare bruciature ai tessuti vegetali.

Le strategie di difesa riportate nelle tabelle sono valide anche per la difesa del pero, con il divieto di utilizzare **Bupirimate** in quanto non autorizzato su questa coltura.

Nelle tabelle sono stati volutamente omessi i trattamenti insetticidi con Etofenprox o Piretrine contro **Cacopsilla melanoneura**, **vettore della malattia degli scopazzi del melo**, che devono essere eseguiti preferibilmente non in miscela con altri prodotti e soprattutto al raggiungimento del picco del volo dell'insetto, segnalato con un nostro specifico avviso che sarà diramato nel momento opportuno.

Sempre a riguardo della difesa dal vettore di *Cacopsilla melanoneura* è consigliato in questo periodo l'utilizzo di caolino a scopo repellente da rinnovare dopo le piogge.

ATTENZIONE: In base a quanto stabilito dal regolamento UE 2018/1981 del 13 dicembre 2018 e dal comunicato del Ministero della Salute del 31 gennaio 2019, per i **prodotti rameici è previsto il vincolo di non superare l'applicazione di 28 kg/ha di rame (metallo) nell'arco di 7 anni. Si consiglia di rispettare il quantitativo massimo di 4 kg/ha per anno.**

Salvaguardia degli alveari: da inizio fioritura fino a caduta petali vige il divieto assoluto di utilizzare prodotti insetticidi, aficidi e acaricidi, diserbanti e disseccanti. E anche al di fuori della fioritura, prima di trattare con i suddetti prodotti è obbligatorio sfalciare le erbe fiorite presenti sotto-chioma.

Le disposizioni per la salvaguardia delle api sono contenute nelle linee guida approvate con PD 1265/2020 e consultabili alla pagina web:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/apifitofarmaci_i.aspx

Limitazioni nell'uso dei fitofarmaci in prossimità di zone frequentate da popolazione e gruppi vulnerabili:

Prima di qualsiasi trattamento in zone agricole che si trovino a meno di 30 metri dalle zone di cui sopra è necessario verificare che nell'etichetta dei fitofarmaci non siano presenti le frasi H che determinano limitazioni (come da tabella di conversione contenuta nell'allegato 1 alla DGR 342/2017 disponibile sul sito web della Regione Autonoma Valle d'Aosta). In questo documento i prodotti soggetti alle limitazioni sono evidenziati in grigio.

Per maggiori informazioni:

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, Ufficio servizi fitosanitari, località La Maladière – Rue de la Maladière n. 39, Saint-Christophe (responsabile tecnico Sandro Dallou, tel. 0165.275382-86/340.0634624 – ispettore fitosanitario Rita Bonfanti, tel. 0165.275405/0165.275420) www.regione.vda.it/agricoltura

Comunicazione a cura dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, Ufficio servizi fitosanitari, in collaborazione con l'Institut Agricole Régional