



Assessorato Agricoltura e Risorse naturali  
Struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali  
**Avviso fitosanitario del 6 maggio 2025 – viticoltura**  
**Difesa da Peronospora, Black rot e Oidio della vite**

Il modello previsionale Horta, segnala che nei vigneti di **Donnas** e **Pont-Saint-Martin** ci sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo delle malattie fungine **Peronospora, Black rot e Oidio**. Tra **Arnad e Montjovet** il rischio peronospora è medio, mentre **nel resto del territorio regionale** è basso, risulta invece medio alto ovunque il rischio di contrarre oidio.

**Nelle zone della bassa valle** si consiglia di intervenire al più presto un prodotto antiperonosporico miscelato con un antioidico, scelti tra quelli indicati nelle tabelle seguenti. Nei vigneti soggetti al **Black rot**, il prodotto antioidico deve essere scelto tra quelli efficaci anche contro questa fitopatia (vedi note tabella dei prodotti antioidici).

**Nella media valle** si consiglia di intervenire con le stesse modalità sopra riportate entro la fine di questa settimana.

**In alta valle (Morgex e La Salle)** intervenire solo con un prodotto antioidico.

LOTTA CHIMICA

**Peronospora**

MISCELA DI P.A. ANTIPERONOSPERICI	NOTE
<b>Fluopicolide + Fosetil di Al</b> <b>Fosetil di Al + Rame</b>	quando si sceglie di utilizzare fosetil Al è opportuno continuare con lo stesso principio attivo nel proseguimento della lotta alla peronospora, almeno una seconda volta
<b>Dimetomorph + Rame</b>	<b>(Attenzione, il Dimetomorph è stato revocato, termine ultimo per l'utilizzo il 20-05-2025 – chi avesse scorte deve usarlo entro questa data)</b>
<b>Mandipropamide + Rame</b>	
<b>Cimoxanil + Rame</b>	
<b>Zoxamide + Rame</b>	

**Oidio:**

Miscelare con l'antiperonosporico di cui sopra uno dei seguenti prodotti antioidici:

P.A. ANTIOIDICI	NOTE
<b>Zolfo bagnabile</b>	Efficace con temperatura di almeno 18 °C
<b>Bupirimate</b>	
<b>Spiroxamina</b>	
<b>Azoxistrobin</b>	efficace anche contro il Black rot
<b>Trifloxistrobin + zolfo bagnabile</b>	efficace anche contro il Black rot
<b>Fluxapiroxad + zolfo bagnabile</b>	efficace anche contro il Black rot

La suddetta strategia di difesa è indicata nella fase precedente alla fioritura. Questa fase è caratterizzata da sviluppo molto rapido della vegetazione, pertanto, anche in assenza di pioggia, occorrerà ripetere gli interventi con regolarità. L'intervallo tra un trattamento e l'altro varia a seconda dei prodotti impiegati e delle condizioni climatiche (sentire il tecnico per indicazioni). Il trattamento dovrà comunque essere ripetuto dopo piogge di intensità superiori a 40 mm che dilavano la copertura.

## LOTTA BIOLOGICA

**Peronospora:** intervenire con un prodotto a base di **Rame**. Preferire dosaggi più bassi a intervalli ridotti tra un trattamento e l'altro per avere una migliore copertura della vegetazione in rapida crescita.

**Oidio:** miscelare al rame un prodotto a base di **zolfo bagnabile**.

Per migliorare la difesa antioidica è possibile miscelare **zolfo bagnabile** degli **induttori di resistenza** quali: **Cerevisane o COS-OGA** (eseguire 2 blocchi di interventi, con 3 trattamenti a blocco a distanza di 8-10 giorni e fare una pausa di almeno 14 gg prima di un secondo blocco) o **Laminarina** (intervenire a blocchi di 3 interventi a 7-8 gg con una pausa di almeno 14 gg prima di un secondo blocco).

**I trattamenti devono essere sempre effettuati su piante asciutte sia in caso di difesa chimica, sia in caso di difesa biologica.**

**Per chiarimenti sulla strategia da utilizzare contattare il proprio tecnico di riferimento.**

Sul sito della regione, nella pagina del servizio fitosanitario è presente la scheda dei trattamenti per la vite, nell'ultima pagina è indicato un esempio di strategia per la difesa. Di seguito il link:

[https://www.regione.vda.it/agricoltura/per\\_gli\\_agricoltori/fitosanitario/schedetrattamenti\\_i.asp](https://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/schedetrattamenti_i.asp)

**ATTENZIONE:** In base a quanto stabilito dal regolamento UE 2018/1981 del 13 dicembre 2018 e dal comunicato del Ministero della Salute del 31 gennaio 2019, per i **prodotti rameici** è previsto il vincolo di non superare l'applicazione di **28 kg/ha di rame (metallo)** nell'arco di **7 anni**. Si consiglia di rispettare il quantitativo massimo di **4 kg/ha per anno**.

**Gli aderenti alla misura 10.1.3 devono controllare le limitazioni di utilizzo consultando il Disciplinare di Produzione Integrata sul sito regionale alla pagina:**

[https://www.regione.vda.it/agricoltura/per\\_gli\\_agricoltori/fitosanitario/disciplinare\\_produzione\\_integrata\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/disciplinare_produzione_integrata_i.aspx)

**ATTENZIONE: per proteggere il patrimonio apistico da possibili effetti negativi provocati da trattamenti fitosanitari è vietato trattare le piante fiorite con prodotti insetticidi, aficidi, acaricidi, diserbanti e disseccanti ed è obbligatorio sfalciare le erbe fiorite presenti sotto-chioma prima di distribuire la miscela fitosanitaria. Queste, e altre indicazioni utili alla salvaguardia delle api, sono contenute nelle linee guida e istruzioni operative approvate con PD n. 1265/2020 e consultabili alla pagina web:**

[https://www.regione.vda.it/agricoltura/per\\_gli\\_agricoltori/fitosanitario/apifitofarmaci\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/apifitofarmaci_i.aspx)

Si raccomanda l'osservanza delle indicazioni contenute nell'allegato n. 1 alla DGR 342/2017 (in prossimità di aree frequentate da popolazione o gruppi vulnerabili occorre apporre apposita cartellonistica e utilizzare prodotti che non riportino in etichetta determinate frasi di rischio). Fondamentale è inoltre il rispetto delle indicazioni contenute nelle etichette dei formulati commerciali relative alle distanze da rispettare dai corsi d'acqua o da altre aree naturali sensibili, soggette a tutela.

*Per maggiori informazioni:*

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, Ufficio servizi fitosanitari, località La Maladière – Rue de la Maladière n. 39, Saint-Christophe (responsabile tecnico Sandro Dallou, tel. 0165.275382-86/340.0634624 – ispettore fitosanitario Rita Bonfanti, tel. 0165.275405/0165.275420)

[www.regione.vda.it/agricoltura](http://www.regione.vda.it/agricoltura)

Comunicazione a cura dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, Ufficio servizi fitosanitari, in collaborazione con l'Institut Agricole Régional