

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali
Struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali
Avviso fitosanitario del 11 agosto 2025 – frutticoltura
Trattamenti contro le malattie da conservazione delle mele.

Nei frutteti dove sono presenti macchie di ticchiolatura, o in caso si verificassero piogge importanti nel periodo precedente la raccolta, occorre intervenire con un trattamento di conservazione facendo attenzione al rispetto del tempo di carenza.

Trattamenti per la prevenzione delle malattie da conservazione

Lotta Chimica

- **Captano:** tutti i prodotti commerciali a base di questo principio attivo non possono essere impiegati a meno di 30 metri da zone frequentate da popolazione o gruppi vulnerabili o a meno di 10 metri se si usano misure di mitigazione della deriva (vedi DGR 342/2917), è sconsigliato su renetta perché riduce la rugginosità; il **tempo di carenza va da 21 a 28 giorni a seconda del prodotto**;
- **Pyraclostrobin+Boscalid** miscela di principi attivi adatta a tutte le varietà - **(tempo di carenza 7 giorni)** non utilizzare questa miscela in caso di presenza nel frutteto di macchie di ticchiolatura per evitare l'insorgere di resistenze;
- **Fludioxonil (tempo di carenza 3 giorni)**;
- **Pyrimettanil + Fludioxonil (tempo di carenza 3 giorni)**;
- **Pyrimettanil (tempo di carenza 7 giorni)**;

Lotta biologica

Ticchiolatura e malattie da conservazione

- **Bicarbonato di potassio** In commercio si trovano anche prodotti PFnPE acquistabili e utilizzabili senza patentino. **Tempo di carenza da 1 a 3 giorni a seconda del prodotto**;
- **Zolfo bagnabile** utilizzare formulazioni registrate contro la ticchiolatura (attenzione, non utilizzare con temperature superiori a 30°C e su piante bagnate). **(tempo di carenza 5 giorni)**;
- **Rame:** Consigliato solo su renetta in quanto provoca rugginosità sui frutti. In prossimità della maturazione si raccomanda di scegliere prodotti non colorati e con i tempi di carenza più brevi (in commercio esistono, infatti, formulati di vario tipo, colorati e non e con **tempi di carenza che variano da 5 a 20 giorni**);

ATTENZIONE!

I SOCI COFRUITS DEVONO SEGUIRE LE INDICAZIONI RELATIVE AI TRATTAMENTI CONTRO LE MALATTIE DA CONSERVAZIONE DIRAMATE DALLA COOPERATIVA

Salvaguardia degli alveari: prima di trattare è obbligatorio sfalcare le erbe fiorite presenti sotto-chioma e vige il divieto assoluto di utilizzare prodotti insetticidi, aficidi e acaricidi, diserbanti e disseccanti da inizio fioritura fino a caduta petali.

(tali disposizioni sono contenute nelle linee guida per la salvaguardia delle api dall'impiego dei fitofarmaci approvate con PD 1265/2020 e consultabili alla pagina web:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/apifitofarmaci_i.aspx

Limitazioni nell'uso dei fitofarmaci in prossimità di zone frequentate da popolazione e gruppi vulnerabili: Prima di qualsiasi trattamento a meno di 30 metri dalle zone di cui sopra è necessario verificare l'assenza in etichetta delle frasi H che determinano limitazioni (come da tabella di conversione contenuta nell'allegato 1 alla DGR 342/2017 disponibile sul sito web della Regione Autonoma valle d'Aosta).

Per maggiori informazioni:

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, Ufficio servizi fitosanitari, località La Maladière – Rue de la Maladière n. 39, Saint-Christophe (responsabile tecnico Sandro Dallou, tel. 0165.275382-86/340.0634624 – ispettore fitosanitario Rita Bonfanti, tel. 0165.275405/0165.275420)

www.regione.vda.it/agricoltura

Comunicazione a cura dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, Ufficio servizi fitosanitari, in collaborazione con l'Institut Agricole Régional