Assessorato Agricoltura e Risorse naturali
Struttura Consorzi di miglioramento fondiario e produzioni vegetali

Avviso fitosanitario del 20 maggio 2022 – frutticoltura

Melo e pero

Lotta alla 1ª generazione di carpocapsa in Media Valle

Difesa dalla ticchiolatura e oidio per tutta la Valle d'Aosta

Si informano i frutticoltori che anche **nelle zone più precoci da Saint Vincent a Saint Pierre** è iniziata la fase di ovideposizione della carpocapsa (*Cydia pomonella*) e che si rende opportuno intervenire tempestivamente con uno dei principi attivi adatti alla lotta precoce (ovicida e larvicida) elencati nella seguente tabella:

LOTTA CHIMICA

PRINCIPIO ATTIVO	NOTE
Triflumuron	**Azione ovicida applicare entro il 24 maggio** **Prodotto revocato, termine utilizzo 30-09-2022**
Tebufenozide	**Azione ovo-larvicida trattare entro il 24 maggio**
Clorantraliniprolo	**Azione ovo-larvicida trattare entro il 27 maggio**

Il momento adatto per l'intervento ovicida e ovo-larvicida varia in funzione del microclima del frutteto e va valutato a livello aziendale anche dopo aver preso visione della somma termica relativa alla propria zona, consultando i grafici elaborati dal centro funzionale e pubblicati sul sito agrometeorologico della Regione VDA alla pagina:
http://cf.regione.vda.it/modelli_agrometeorologici.php

NOTE:

1) Attendere circa una settimana per intervenire contro carpocapsa se si è utilizzato **Metossifenozide** contro i ricamatori negli ultimi 8-10 giorni.
2) Nelle zone dell'envers (Gressan, Jovençan, Aymavilles e Villeneuve ritardare l'intervento di un paio di giorni.
3) Nelle zone a quote più elevate o in quelle dove, per la particolare giacitura ed esposizione, lo **sviluppo vegetativo è ritardato rispetto al fondovalle**, gli interventi devono essere posticipati di 5-10 giorni o più rispetto ai termini temporali sopra indicati.

LOTTA BIOLOGICA

Intervenire con il **Virus della granulosi** ritardando l'applicazione di 3-5 giorni rispetto alle date sopra riportate. Il trattamento va ripetuto dopo 8-10 giorni seguendo le indicazioni riportate in etichetta che variano a seconda del prodotto commerciale. In alcuni casi può essere necessario un terzo intervento

TICCHIOLATURA e OIDIO
INTERVENIRE SEGUENDO LE INDICAZIONI RIPORTATE NELL'AVVISO DEL 5 MAGGIO

Salvaguardia degli alveari: da inizio fioritura fino a caduta petali vige il divieto assoluto di utilizzare prodotti insetticidi, aficidi e acaricidi, diserbanti e disseccanti. Prima di trattare con i suddetti prodotti è inoltre obbligatorio sfalciare le erbe fiorite presenti sotto-chioma.
Le disposizioni per la salvaguardia delle api sono contenute nelle linee guida approvate con PD 1265/2020 e consultabili alla pagina web:
https://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/apifitofarmaci_i.aspx

Limitazioni nell'uso dei fitofarmaci in prossimità di zone frequentate da popolazione e gruppi vulnerabili: Prima di qualsiasi trattamento in zone agricole che si trovino a meno di 30 metri dalle zone di cui sopra è necessario verificare che nell'etichetta dei fitofarmaci non siano presenti le frasi H che determinano limitazioni (come da tabella di conversione contenuta nell'allegato 1 alla DGR 342/2017 disponibile sul sito web della Regione Autonoma valle d'Aosta). In prossimità di tali zone è inoltre obbligatorio apporre il cartello di avviso previsto dall'allegato alla DGR 342/2017.

https://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/cartellonistica_i.aspx

Per maggiori informazioni:
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, Ufficio servizi fitosanitari, località La Maladière – Rue de la Maladière n. 39, Saint-Christophe (responsabile tecnico Sandro Dallou, tel. 0165.275382/340.0634624 – ispettore fitosanitario Rita Bonfanti, tel. 0165.275405/0165.275211)

Comunicazione a cura dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, Ufficio servizi fitosanitari, in collaborazione con l'Institut Agricole Régional