Région Autonome Vallée d'Aoste | Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali
Struttura Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari

Avviso fitosanitario del 2 agosto 2022 – frutticoltura

Melo – trattamenti contro le malattie da conservazione e controllo carpocapsa.

Nei frutteti dove sono assenti macchie di ticchiolatura e se l'andamento climatico particolarmente caldo e secco continua fino alla raccolta, l'intervento contro le malattie da conservazione potrebbe essere superfluo - si consiglia di monitorale la meteo e in caso di precipitazioni eseguire il trattamento come di seguito indicato, facendo attenzione al rispetto del tempo di carenza visto che la maturazione sarà anticipata - Per le varietà più precoci (Gala) utilizzare prodotti con meno giorni di carenza.

Trattamenti per la prevenzione delle malattie da conservazione

Lotta Chimica

- **Captano**: tutti i prodotti commerciali a base di questo principio attivo non possono essere impiegati a meno di 30 metri da zone frequentate da popolazione o gruppi vulnerabili o a meno di 10 metri se si usano misure di mitigazione della deriva (vedi DGR 342/2917), è sconsigliato su renetta perché riduce la rugginosità; il **tempo di carenza di carenza va da 21 a 28 giorni**, prestare quindi molta attenzione alla data di utilizzo in rapporto alla presunta data di raccolta.
- **Pyraclostrobin+Boscalid** miscela di principi attivi adatta a tutte le varietà - (tempo di carenza 7 giorni) – non utilizzare questa miscela in caso di presenza nel frutteto di macchie di ticchiolatura dovute a infezioni primarie per evitare l'insorgere di resistenze;
- **Fludioxonil** (tempo di carenza 7 giorni);
- **Rame** (autorizzato anche in agricoltura biologica): consigliato solo su renetta, in quanto provoca rugginosità sul frutto. Si raccomanda di scegliere prodotti non colorati e con i tempi di carenza più brevi (in commercio esistono, infatti, formulati di vario tipo, colorati e non, e con tempi di carenza che variano da 5 a 20 giorni).

Lotta biologica

Ticchiolatura e malattie da conservazione

- **Zolfo bagnabile** utilizzare formulazioni registrate contro la ticchiolatura (attenzione, non utilizzare con temperature superiori a 30°C e su piante bagnate). 5 giorni di carenza;
- **Rame**: Consigliato solo su renetta in quanto provoca rugginosità sul frutto. In prossimità della maturazione si raccomanda di scegliere prodotti non colorati e con i tempi di carenza più brevi (in commercio esistono, infatti, formulati di vario tipo, colorati e non, e con tempi di carenza che variano da 5 a 20 giorni);

Carpocapsa

Le temperature elevate hanno favorito il prolungarsi delle generazioni dell'insetto, **nelle zone più a rischio** potrebbero presentarsi ancora danni soprattutto sulle varietà più tardive. Si consiglia pertanto di verificare la presenza di fori sulle mele in pianta e al superamento della soglia di intervento (8 mele bucate su mille frutti controllati), contattare i tecnici di riferimento per eventuali interventi di difesa.

Nei frutteti che si trovano a meno di 30 metri da zone frequentate da popolazione o gruppi vulnerabili controllare sempre le frasi H presenti in etichetta ed escludere i prodotti non consentiti ai sensi del Piano

di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (La distanza di 30 metri può essere ridotta a 10 metri se si usano misure di mitigazione della deriva) Per maggiori informazioni consultare la DGR 342/2917).

ATTENZIONE!
I SOCI COFRUITS DEVONO SEGUIRE LE INDICAZIONI RELATIVE AI TRATTAMENTI CONTRO LE MALATTIE DA CONSEVAZIONE DIRAMATE DALLA COOPERATIVA

Per ulteriori chiarimenti sulla strategia da adottare, consultare il proprio tecnico di riferimento.

Chi segue le misure agroambientali, deve verificare per ogni prodotto fitosanitario il numero massimo di interventi consentiti non solo consultando l'etichetta, ma anche verificando le eventuali ulteriori restrizioni previste dal disciplinare del melo pubblicato al seguente link:
https://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/disciplinare_produzione_integrata_i.aspx

ATTENZIONE: per proteggere il patrimonio apistico da possibili effetti negativi provocati da trattamenti fitosanitari è vietato trattare gli alberi in fiore con prodotti insetticidi, aficidi, acaricidi, diserbanti e disseccanti ed è obbligatorio sfalciare le erbe fiorite presenti sotto-chioma prima di distribuire la miscela. Queste, e altre indicazioni utili alla salvaguardia delle api, sono contenute nelle linee guida e istruzioni operative approvate con PD n. 1265/2020 pubblicate sul sito web della regione alla seguente pagina:
https://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/apifitofarmaci_i.aspx

Si raccomanda l'osservanza delle indicazioni contenute nell'allegato n. 1 alla DGR 342/2017 (cartellonistica e distanze minime da osservare in prossimità delle aree frequentate da popolazione e gruppi vulnerabili e il rispetto delle indicazioni contenute nelle etichette dei formulati commerciali relative alle distanze da rispettare dai corsi d'acqua o da altre aree naturali sensibili, soggette a tutela.

Per maggiori informazioni:
Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, Ufficio servizi fitosanitari, località La Maladière – Rue de la Maladière n. 39, Saint-Christophe (responsabile tecnico Sandro Dallou, tel. 0165.275382/340.0634624 – ispettore fitosanitario Rita Bonfanti, tel. 0165.275405/0165.275401)
www.regione.vda.it/agricoltura