

Tavola 3.61 - Indice di Massa Corporea (IMC) - Confronto regionale/nazionale (valori percentuali) - Valle d'Aosta - Anni 2008 - 2012

| INDICE DI MASSA CORPOREA | Valore assunto usando mediana di riferimento* | Valore regionale | | | Valore nazionale 2012 |
|--|---|------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | 2008 | 2010 | 2012 | |
| Prevalenza di bambini sotto-normopeso | 84% | 76% | 79% | 76% | 67% |
| Prevalenza di bambini sovrappeso e obesi** | 16% | 24% | 21% | 24% | 33% |
| Prevalenza di bambini sovrappeso | 11% | 18% | 17% | 18% | 22% |
| Prevalenza di bambini obesi** | 5% | 6% | 4% | 6% | 11% |
| Mediana di IMC | 15,8 | 16,6 | 16,5 | 16,8 | 17,4 |

Fonte: Indagine Okkio alla SALUTE - Azienda USL Valle d'Aosta - Regione Autonoma Valle d'Aosta

I bambini partecipanti all'indagine avevano un'età superiore o uguale agli 8 anni.

Al momento della rilevazione, la grande maggioranza dei bambini che ha partecipato allo studio aveva fra 8 e 9 anni, con una media di 8 anni e 10 mesi di vita

* Per ottenere un valore di riferimento con cui confrontare la prevalenza di sovrappeso e obesità della popolazione in studio, sono stati calcolati i valori che la popolazione nazionale avrebbe se la mediana dell'IMC fosse pari a quella della popolazione di riferimento utilizzata da Cole et al (apposito comitato che ha elaborato le soglie per la valutazione del sovrappeso e dell'obesità infantile che vengono adottate, dal 2000, a livello internazionale) per calcolare le soglie di sovrappeso e obesità

** Variabili per le quali è stato effettuato un confronto tra le rilevazioni svolte a livello regionale