

**Tavola 3.42 - Prevalenze di sovrappeso e obesità tra i bambini di 8 - 9 anni per regione <sup>(a)</sup> (Valori percentuali) - Anno 2016**

| REGIONI                             | Sovrappeso  | Obeso      | Obesità grave |
|-------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Piemonte                            | 18,4        | 4,7        | 1,3           |
| <b>Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste</b> | <b>15,6</b> | <b>3,5</b> | <b>0,7</b>    |
| Liguria                             | 21,7        | 5,0        | 1,4           |
| Lombardia                           | 19,2        | 4,5        | 1,1           |
| Provincia Autonoma Bolzano/Bozen    | 12,2        | 2,4        | 0,3           |
| Provincia Autonoma Trento           | 18,1        | 4,7        | 0,5           |
| Veneto                              | 19,3        | 4,7        | 1,0           |
| Friuli-Venezia Giulia               | 19,1        | 4,1        | 0,9           |
| Emilia-Romagna                      | 21,0        | 6,2        | 1,5           |
| Toscana                             | 21,4        | 4,5        | 1,1           |
| Umbria                              | 20,4        | 7,1        | 2,1           |
| Marche                              | 21,5        | 7,8        | 2,6           |
| Lazio                               | 23,1        | 8,1        | 1,5           |
| Abruzzo                             | 22,3        | 8,2        | 2,2           |
| Molise                              | 24,4        | 11,4       | 4,3           |
| Campania                            | 26,2        | 13,2       | 4,7           |
| Puglia                              | 22,5        | 9,4        | 3,2           |
| Basilicata                          | 23,9        | 8,6        | 4,5           |
| Calabria                            | 25,0        | 11,7       | 4,7           |
| Sicilia                             | 22,3        | 9,7        | 3,3           |
| Sardegna                            | 17,2        | 4,8        | 0,7           |

Fonte: Istituto Superiore di Sanità - Indagine "OKkio alla SALUTE" Anno 2016

(a) Prevalenze calcolate utilizzando i cut-off IOTF (International Obesity Task Force)